

HP400 è un **fisioattivatore** esclusivo a base di un mix di proteine di origine batterica ottenute da fermentazione di ceppi selezionati. **HP400** agisce come molecola segnale stimolando specifici recettori presenti sulle foglie, accelerando e amplificando i processi metabolici legati alla fase fenologica in corso. La massima espressione di **HP400** la si ottiene su colture ben equilibrate e nutrite in quanto la sua risposta sistemica deve essere sostenuta da tutti gli elementi nutritivi necessari.

COSA CONTIENE

Proteine $\alpha\beta$	1 %
Coformulanti q.b. a 100	



CONFEZIONE
200g

i VANTAGGI di

HP 400

Anticipa ed uniforma la maturazione

Garantisce l'aumento della resa

Migliora la qualità anche con elevati livelli produttivi

Aumenta la pezzatura

Incremento del grado Brix





INSALATE

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
Da post trapianto:
100-200 g/ha
Numero interventi: 2-3
Intervallo minimo: 7-10 giorni



POMACEE
E DRUPACEE

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
Da allegagione 150g/ha
Numero interventi: 4-6
Intervallo minimo: 14-20 giorni



TABACCO

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
Da 30 giorni dopo il trapianto:
100-120 g/ha
Numero interventi: 2
Intervallo minimo: 14-20 giorni



ACTINIDIA

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
Da inizio ingrossamento frutto:
300 g/ha
Numero interventi: 4
Intervallo minimo: 15-20 giorni



FLORICOLE

CONSIGLI PER L'IMPIEGO


Applicazione fogliare:
Da sviluppo vegetativo a
fioritura: 100-200 g/ha
Numero interventi: 2-3
Intervallo minimo: 10-14 giorni



VITE

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
Da inizio invaiatura: 200g/ha
Numero interventi: 2
Intervallo minimo: 10-14



POMODORO
DA INDUSTRIA

CONSIGLI PER L'IMPIEGO


Applicazione fogliare:
In pre trapianto 20g/10L
su piantine,
Da fioritura primo palco 50g/
ha
Numero interventi: 5-6
Intervallo minimo: 7-14 giorni
Invaatura 50-70% 100g/ha
Numero interventi: 1



POMODORO DA
MENZA, PEPERONE E
MELANZANA

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
In pre trapianto
20g/10L su piantine,
Da fioritura primo palco
100-200 g/ha
Numero interventi: 4-8
Intervallo minimo: 7-14 giorni



FRAGOLA

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
Da pre-fioritura 50-100 g/ha,
Numero interventi: 6-8
Intervallo minimo: 7-10 giorni



ZUCCHINO E CETRIOLO

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
In pre trapianto
20g/10L su piantine,
Da post trapianto 50g/ha
Numero interventi: 6-10
Intervallo minimo: 7-10 giorni



MELONE,
ANGURIA E ZUCCA

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicazione fogliare:
In pre trapianto
20g/10L su piantine,
Da post trapianto 100g/ha
Numero interventi: 3
Intervallo minimo: 7-14 giorni

Le dosi sono da intendersi indicative, verificare il dosaggio consultando il catalogo sul sito www.sipcam.it